

類

證

治

裁

類證治裁卷之五

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝本校正

頭風 雷頭風附

風邪上干新感爲頭痛。深久則爲頭風。其症頭巔重暈。或頭皮麻痺。或耳鳴目眩。眉稜緊掣。由素有痰火。復因當風取涼。邪從風府入腦。鬱而爲熱。爲痛甚。則目病昏眩。頭風不治。必害眼。當分偏正。左右寒熱氣血治之。痛在正頂。多太陽經風鬱。宜川芎羌活蔓荆蘇葉等散之。太陽經巔絡腦痛在左右。多少陽經火鬱。宜甘菊花丹皮山梔桑葉鉤藤等發之。少陽經後也。痛在左右。多少陽經火鬱。宜甘菊花丹皮山梔桑葉鉤藤等發之。少陽經下耳及耳痛偏左爲風虛。宜川芎當歸防風薄荷。痛偏右爲痰熱。宜蒼朮半夏黃芩石

膏氣虛者因勞

補中益氣湯加川芎天麻

血虛者善驚

四物湯加薄荷白芷

熱痛者惡熱

消風

冷痺者畏寒

追風散

寒熱久鬱發時悶痛欲縣裏者多痰

二陳湯加

酒茶荊芥川芎

風兼熱者

茶調散

寒挾溼者

導痰湯加

痛連齒齦

者荊芥薄荷

痛掣眉稜者

湯選奇

鼻流鼻涕者

散搖鼻出涎

腦後

筋掣者

鉤藤荷葉連翹苦丁茶甘菊

氣上攻痛者

全蝎散

年久不愈者

烏頭南星末葱汁調

塗太

婦女血分受風者

養血祛風湯

其有因膽火上逆為暈痛治宜泄

熱者

用羚羊角生地丹皮

因肝陽乘胃為嘔吐

治宜熄風者

用茯苓

菊炭鉤藤半夏

因肝陰虛內風動

治宜滋液者

川復脈湯去參薑桂加雞子黃白芍

因暑熱上蒙清竅

治宜清滲者

用石膏荷梗薄荷

因陰傷陽浮齒

痛筋惕治宜鎮攝者

用阿膠牡蠣生地

因內風頭痛淚冷目昏治

宜潤養者。用杞子首烏茯苓白芍柏子仁甘菊炭。頭腦鳴響狀如蟲蛙。名天白蟻者。茶子末。頭多白屑作癢者。零陵香白芷煎汁。雷頭風腫痛起塊憎吹鼻效。寒壯熱腦震如雷鳴者。清震湯解雷湯。雷頭風病在三陽不可過用寒涼重劑。誅伐無過河間立清震湯。腦風項背怯寒腦戶穴冷者。神聖散。首風因於新沐汗多惡風者。川芎九白芷九餘參頭痛門治。

頭風脈候

浮爲風緊爲寒。浮滑爲風痰洪數爲風熱。陽弦爲頭痛細而堅爲溼。弦而濇爲氣虛。芤爲血虛。滑爲痰厥。頭痛脈急短濇者死。凡診寸脈短者頭痛寸口緊急或浮或短或弦皆主頭痛。

附方

氣虛血虛熱痛冷痛痰痛風熱風熱痰溼齒銀

補中益氣湯 見一卷中風

四物湯 見一卷中風

消風散 見二卷失音

追風散 炮川烏 煨石膏 炒僵蠶 荆 防 芎 草各
五錢 天麻 製南星 白附子 羌活 地龍

全蠍 白芷各二錢半 乳香 沒藥各一錢二分
爲末每服五分 茶調下

二陳湯 見一卷中風

茶調散 見一卷傷風

菊花散 甘菊花 旋覆花 防風 枳壳 羌活 石膏
蔓荊子 甘草各一錢五分 薑三片

導痰湯 見一卷中風

鉤藤散 鉤藤 陳 夏 防 芎 參 草 麥冬 石膏
甘菊 或加生地 荆芥

鼻搖第臭稜眉

選奇湯 防風 羌活各三錢 黃芩一錢 甘草八分

芎藭散 川芎 硃砂 石膏 片腦 人參 茯苓 炙草

透頂散 細辛 犀角 山梔 麥冬 阿膠 丁香三粒 糯米七粒 研勻用豆許隨病左右搖

鼻出涎

即愈

全蠍散 全蠍廿一个 地龍六条 土狗二个 五倍子五錢 爲末酒調攤貼太陽穴

養血祛風湯 芎藭 歸 荆 防 羌 辛 地 夏 草 葉本 石膏 旋覆 蔓荆各五分 薑 棗

復脈湯 見一卷中風

清震湯 升麻 蒼朮 荷葉各四錢

解雷湯 落蒂子三錢 升麻 川芎 蒼朮各一錢 鮮荷葉水 加薑 再入藥煎七分服 先煎

神聖散 葛根半生半炒 麻黃 細辛 藜香 等分爲末 薄荷荆芥湯下

風腦頭雷頭雷液滋風血攻氣

續風

王

首風

川芎丸

川芎四兩

天麻一兩

蜜和每兩作十丸

以一

風首

白芷丸

新白芷不拘多少

挂細以蘿蔔汁浸晒乾研蜜丸彈

子大每一丸細嚼

荆芥湯下

一名都梁丸

雷頭風

止

憎寒發熱頭痛腦如雷鳴一夕頂發塊礪甚多延及項後都

成疙瘩俗醫以爲外症用敷藥罔效診其脈浮大審知爲雷頭

風按東垣先生論此症狀類傷寒病在三陽不可過用寒涼重

劑誅伐無過故劉河間立清震湯治之用升麻

錢二蒼朮米泔浸炒四錢

薄荷葉

一枚薄荷三錢

如法二服立消○此痰火上升故成結核腫

痛用蒼朮除溼痰薄荷散風火升麻荷葉引入巔頂升發陽氣

自得汗而腫消

癰風論治

腎臟風 赤白遊風

繡毯風

暍來風

蛇皮風

鵝掌風

癰風惡疾也。俗名大麻風。其症皮肉麻頑。身面疙瘡。搔之則癢痛。

腐潰漸至。目紅鼻赤。四體攣搐。頭面笑腫。蓋中天地間一種風毒。

厲氣淫於腑臟骨髓。注於經絡肢節。久而後發。亦有骨肉傳染而

得者。立齋分別五臟受病。謂眉先落者。毒在肺。面發紫泡者。毒在

肝。足底痛或穿者。毒在腎。遍身如癬者。毒在脾。目先損者。毒在心。

一皮死。

麻木不仁

二肉死。

鍼刺不痛

三血死。

潰爛流膿

四筋死。

指脫趾墮

五骨死。

鼻柱崩塌

至於聲啞目盲。皆為難治。內經治法。以銳鍼刺其腫上。出惡血。重

洩毒也。其惡血滯在肌表。經絡者。宜汗宜刺。

汗用紫萍散。刺取委中穴。毒蘊腑

臟。非蕩滌不除。

如涼膈雙解之類。

毒在外。非砭鍼不散。

砭刺臂腿手足指縫出血。表裏

毒盛非外，內洩不退，上體患多，以散。取毒血從齒縫中出，并

刺臂腕指縫下體患多，以散。再造取蟲積從穀道中出，仍鍼腿脛趾

縫上下相等，用散。必勝兼取治法，內通腑臟，外達經絡，養營益衛，補

正。逐邪若妄投燥熱，膿水淋漓，肝血益涸，風熱益熾，腎水益傷矣。

初起頭面搔癢，發出紅紫疹塊者，用防風通聖散，加苦參、天麻、蟬

外用。白玉蟾浴湯，加羌活、薄荷、薤白煎洗。浴後，白玉蟾擦藥，擦之其燥

起白屑，繫血不榮膚。四物湯加荆防，搔如隔帛，繫氣不充表。養營

面部麻木，繫氣血不能上榮。補中益氣湯，癢疹赤暈，繫風熱入營。

實者胡麻散。疔瘡破癢，繫風毒傷血。羌活當歸散，或當指節攣拳。

虛者祛風丸。緊陰火燥筋，加味逍遙散，加鉤鼻赤眉落，屬肺經風熱。人參消風

散，加天麻。

而發紫泡屬肝經風毒。梔子清肝湯。加鉤藤。筋骨攣痛。屬肝腎。

陰虛。六味地黃湯。口眼喎斜屬風動痙厥。用全蠍酒洗鹽焙研。殭蠶白。

寒熱往來。小柴胡湯。陽虛怯冷。補中益氣湯。瘡久潰爛。參紅玉散。足心

穿破。服六味湯。氣血虧敗。固命丹。通治風癩。胡麻丸。一切毒癘危症。

五龍丸。千年藥。東華玉。若夫癰瘍類症。則有兩廉如癖。蟲蝕成瘡。

者為腎臟風。用四生散以去風邪。腎囊溼癢者為繡毬風。蛇床子。

椒苗皮頑肌燥至秋癢發者為雁來風。宜羌活白芷散。膚裂癢痛。

形似蛇紋者為蛇皮風。初用火龍散。繼服補劑。外用雄黃硫黃。

心頑厚白皮鱗屑者為鷲掌風。煎湯熏洗。再用桐油調。鴿糞搽之。

臂腿痞癰遊走不定者為白赤遊風。赤用加味逍遙散。其肌肉斑駁。

紫爲紫癰風。通用川附硫黃研末薑汁調勻。茄蒂身發紫斑延暈。
白爲白癰風。擦之。或用水銀輕粉調薑汁擦之。
如霞者爲紫雲風。何首烏散加稀莧蛇。牛皮頑癬。用火酒浸土槿
川椒羌活斑蝥朝腦紅砒烟膏。新久疥癩。一掃夏月汗斑。用蜜陀
明礬以穿山甲刮破筆搽之。
糖醋調黃雀斑酒刺白屑風癢。玉肌散搽。此因癘風類及之。他如脫跟
瓜蒂擦之。
魚鱗。戴蚝。蛇蚤。雞爪等風。不過多立名色。前明沈氏崑科。前明沈
解圍元藪四卷。以祛風瀉火殺蟲排毒爲先。補血壯元導滯堅筋
皆論風癰治法。以祛風瀉火殺蟲排毒爲先。補血壯元導滯堅筋
相濟忌用熏刺鋒鏹輕粉戒房室禁炙煖鹽醬。大楓子及一切辛
輩動風食品。方可延生。否則愈而再發必死。昔孫真人治此症百
餘人得免於死者二。朱丹溪治五人得免者僅一婦人。然則癘豈
易治哉。

癘風脈候

癘風陽脈浮弦。前關陰脈實大。關後兩寸浮而緊。或浮而洪。浮緩者少。治洪大而數。或沈實者難治。脈若沈而病反在上。浮而病反在下。皆不治。

附方

紫萍散

紫背浮萍一味。晒乾研末。每服三錢。

以黑豆淋酒

涼膈散

見一卷中風

雙解散

見一卷疫

樗皮散

樗皮四兩炒灰

荊芥穗二兩

炙草五錢

枳壳

醉仙散

明麻仁二兩

荊芥穗

每服四五錢

枳壳俱炒各一兩

白蜜藥

防風

花柳各五錢

為末每用一兩五錢

磨服

入輕粉二錢 拌勻每服一錢茶清調晨午各一服服至五

七日齒痛中出臭涎令人如醉下盡惡物病根乃去 一方

多乳香 沒藥 麝香 全蠍

蛤粉 大楓子 藿香等味

再造散 鬱金 角刺各五錢 大黃製一兩 白牽牛取頭

必勝散 檳榔 末半生半炒各五錢 為末酒下五錢 白牽牛取頭

錢 為末分七服 糖五匙 甘草生熟各半二錢 輕粉二

薑汁五匙調服 防風通聖散 荆 連翹 歸 芍 芎 朮 蒼 梔 桔 石

膏 滑石

八珍湯 見一卷中風

聖愈湯 見二卷勞瘵

白玉膏 浴湯 參 耳子 馬鞭草 防風 荆芥 紫蘇 苦 銀花 白芷 遍地香 澤蘭

氣血兩補 洗浴

疹塊

下上體下

外治血燥血虛氣陷風熱、風熱毒血熱血燥

白玉蟾擦藥 白芷 草烏 南星 杏仁 半夏 大楓子

四物湯 地 芎 歸 芍 蛇床子 等分爲末薑片擦之

養營湯 見二卷勞瘵

補中益氣湯 見一卷中風

胡麻散 胡麻兩半 苦參 荆芥 首烏各八錢 威靈仙

炙草各六錢 蔓荊子 白蒺藜炒 每服三錢

祛風丸 耆 枳 防 芍 杞 草 地骨皮 生地 熟

羌活當歸散 歸 黃連 芎 羌 防 荆 芩 翹 芷 草

當歸飲 歸 芎 地 芍 荆 防 蒺藜各錢半 耆

加味逍遙散 見一卷火

肺風肢攣

消風散 見二卷失音

換肌散 白花蛇 黑花蛇酒浸各三兩 地龍 當歸 細辛 白芷 天麻 蔓荊 威靈仙 荊芥 菊花

苦參 紫參 沙參 木賊草 白蒺藜 不灰木 甘草 天冬 赤芍 九節菖蒲 定風草 首烏 胡麻 草烏

炮去皮臍 川芎 蒼朮 木鼈子各一兩 研末每服五錢溫酒調下

梔子清肝湯 柴梔 丹各二錢 歸 芍 苓 芎 牛蒡 各七分 甘草五分 水煎

六味丸 見一卷中風

小柴胡湯 見一卷溫

十全大補湯 見一卷中風

紅玉散 文蛤 白芷 當歸 大黃 白芨 草烏各一兩 乳香 沒藥 兒茶 雄黃 血竭 韶粉 東丹 各三錢 為末

香油調搽

肝火腎虛寒熱陽虛瘡爛

敷外

心足

虛風

治通

治通

坎離膏 血竭三錢 冰片一錢 輕粉 水銀各二錢 大
麝香二分 楓子一兩 白蠟五錢 研極細加熬熟香油調入

以甘草湯洗擦

香珠散 木香 硃砂 赤石脂 東丹 車前子 各等分
研細先以茶葉 川椒煎湯洗淨 再摻藥 外用

綿紙
紮好

固命丹 人參 熟地各四兩 杞子 麥冬各六兩 茯苓
當歸各十六兩 仙靈脾取葉一觔去毛酒拌蒸

為末蜜丸 每服
四十九丸米湯下

猗薺丸 猗薺草五月取赤莖者陰乾以蜜酒蒸晒一觔 歸
芍 熟地各一兩 川烏黑豆製六錢 羌活 防

風各一兩 蜜丸
二錢以酒下

胡麻丸 胡麻一觔 苦參皮五觔酒浸 荆芥穗四觔 猗
薺草三觔 蒼耳葉 紫背浮萍各二斤晒 研末

酒糊丸 硃砂為衣
每服百丸

追毒

黃龍丸

船上硫黃打碎鎔化傾入礮醋內取淨硫一觔入竹筒內以蠟封口浸糞缸中一年取起放長流水中四

十九日

松香鎔化加大酒煮七沸傾入冷水內但取淨松

香三兩

茅米米泔浸刮一觔檀香白膠香川烏炮

川芎各四兩

惡實草烏炮天麻各三兩地龍二兩

研末陳米糊丸

每服五十九開水下

新陳

烏龍丸

肥皂角刮去皮筋子水浸槌爛絞去渣取汁入瓦器用黑牽牛末共搗為丸桐子大每服五十九

白湯下

利三

五次不傷正氣

逐逐

白龍丸

乳香沒藥川烏草烏地龍南星酒糊每服四十丸或酒或荆芥湯下

除經

花龍丸

蒼朮黃蘗龜壳酥炙牛膝當歸草薺防已茄根皮各一兩酒糊丸每服百丸

痛瘥

赤龍丸

麝香二錢半乳香沒藥當歸各七錢地龍白膠香各二兩五錢木鼈子五錢川烏五錢

脂各二兩

京墨線膠炒紫背浮萍各二兩五錢飯

九龍眼大

日服一丸酒下又名一粒金丹

驅風

千年藥

蒼朮羌活烏藥風藤防己防風白芷大黃獨活藥本桔梗草烏柴胡黃芩

壽三十三種

尹仙傳方麻頑

腎藏

天麻	細辛	甘松	蔓荊子	五加皮	白蒺藜	川斷
白芍	南星	大腹皮	角刺	薄荷	各三兩	升
麻各五錢	紫背浮萍	一觔	麻黃	六錢	當歸	苦參
二兩	煎去渣	煉成膏	用	人參	白朮	沒藥
牛膝	香蛇	血竭	茯苓	胡麻	松脂	羌蠶
以前膏和九彈子	大硃砂	為衣	金箔	包裹	遠年病	服十九
近年服五七丸	用蘇	酒磨	服汗	出則愈	此方	張真人
遇過傳內有蟾蜍	麝香	冰片	磁石	人牙等		
東華玉髓	大楓子	研末	隔湯	化油	四兩	乳香
一錢	琥珀	珍珠	各三錢	雄黃	五錢	麝香
冰片三錢	芒硝	入分	大風	油調	藥每服	一錢
馮夷瓊漿	川烏	苦參	羌活	防風	胡麻	甘菊花
歸川芎	黃芩	白芍	牛膝	獨活	白芷	黃連
生地	何首烏	威靈仙	金銀花	各五錢	右藥	勻兩帖
用酒二餅	密封煮	每一日	進一杯	治疔瘡	瘰癧	拳割
知痛者輕則一料	愈已					剋不
四生散	白附子	獨活	黃青	白蒺藜	炒	各等分
每服二錢		用猪腰子	劈開入藥	淫紙裏	煨熟	鹽

湯下

蛇床子湯

蛇床子 枯礬五錢

獨活

苦參

防風

荊芥各三錢

羌活白芷散

羌活 白芷 柴胡

荊芥 蔓荊子

防風

黃芩各一錢

代赭石

火龍散

人牙一兩半 醋煅各一兩

雄黃

辰砂

大黃酒蒸

代赭石

大消風散

防風

黃芩一兩

胡麻十兩

乳香

大楓子

五兩

當歸

黃蘗各二兩

黃芩一兩

胡麻十兩

乳香

大楓子

何首烏散

何首烏

防風

白蒺藜

枳殼

天麻

僵蠶

水煎服

一掃光

防風

荊芥

苦參

地骨皮

薄荷

甘草

爲

玉肌散

末每服三錢

蜜水調下

白芷一兩

白附子五

錢

爲末

每晚用數錢搽面

斑雀癩疥

雲紫

掌驚皮蛇來雁毬繡

藥擦

肥皂丸

荆芥穗

藁本

白芷

羌活

防風

薄荷

甘

三筋

搗丸

晒乾晨擦

山柰


朴硝各一兩

爲末

入肥皂

角去子

絃



癘風

服叔傳染毒癘山足趾麻木漸至肌肉不仁身發紅暈常服京口
耑門治風丸散大率瀉毒品味如苦參丸必勝散等類初服大
便日三四行紅暈雖退而精神日削纏綿數載眉脫眼斜予謂
驅毒宜兼補元否則正氣陷下邪毒留滯非治法矣用八珍丸
料加製首烏生杜仲炙黃耆蒸牛膝玉竹天麻獨活秦艽威靈
仙乳香沒藥蜜丸兼服酒藥用白花蛇穿山甲松節金毛狗脊
威靈仙桑寄生苦參丹參當歸玉竹木瓜桂枝浸煮溫服一料
精神稍復痺痛亦定後仍服京口丸散便瀉食減筋攣肉腐卒
成不救

某 癘風初起左足跟出水左手麻痺不隨脉虛濡按之不起此陰血虛而受風溼癘毒也用熟地當歸川芎杞子首烏白朮黃耆牛膝生杜仲五加皮獨活桂枝鉤藤薑黃熬膏冲酒服手足運掉得舒然此症乃疹癘毒邪乘虛襲人經絡經謂邪之所湊其氣必虛若不遠帷幙慎調攝久之筋骨刺痛眉落眼斜鼻塌肉腐十不一生矣

周 壯歲感前症初由臂臑腫硬手腕痺痛延至遍體上下骨節攣痛面發紅斑溼毒淋漓多在支節診之脉沈數此癘毒從經絡竄入骨髓須用鍼砭去惡血以洩毒非藥力所及辭不治

痺症論治

諸痺。風寒溼三氣雜合。而犯其經絡之陰也。風多則引注。寒多則
掣痛。溼多則重著。良由營衛先虛。腠理不密。風寒溼乘虛內襲。正
氣爲邪所阻。不能宣行。因而留滯。氣血凝滯。久而成痺。或肌肉麻
頑。或肢節攣急。或半體偏枯。或偏身走注疼痛。其不痛者。病久入
深也。故在骨則重而不舉。在血則凝而不流。在筋則屈而不伸。在
肉則麻木不仁。在皮則皴揭不榮。皆痺而不痛。蓋痺者。閉而不通。
邪在陰分也。故經以病在陽爲風。在陰爲痺。陰陽俱病爲風痺。經言
三氣雜合。謂言痺病所因也。在陰爲痺。分言經痺論曰。風寒溼三
表裏有殊也。陰陽俱病。表症更兼裏症也。氣雜至。合而爲痺。痺非偏其風勝者爲行痺。風行而不定。寒勝者
受一氣如走注之類。

為痛痺

寒疑則陽氣不行。痛有定處。即痛風。

溼勝者為着痺

重著不移。或腫痛。或不

即麻木也。

以冬遇此為骨痺

冬氣在骨。

以春遇此為筋痺

春氣在筋。

以夏遇此為

脈痺

夏氣在脈。

以至陰遇此為肌痺

長夏氣在肌肉。

以秋遇此為皮痺

秋氣在皮。

行痺痛痺。著痺痺症。大綱又以所遇之時而命名。非此外別有骨筋脈等痺也。

五臟皆有合病。久而不去

者。內舍於其合

經云。諸痺不已。亦溢內也。

風勝者易已。留皮膚者逢熱。故骨痺不已。復感於邪。內舍於腎。筋痺不已。復感於邪。內舍

則縱。

於肝。脈痺不已。復感於邪。內舍於心。肌痺不已。復感於邪。內舍於

脾。皮痺不已。復感於邪。內舍於肺。

此經病入臟也。經論五痺之入

臟者曰。肺痺。煩滿喘而嘔。心痺

脈不通。煩則心下鼓暴。上氣而喘。噎乾善噫。厥氣上則恐。肝痺。夜

臥則驚多。飲數小便。上為引如懷。腎痺。善脹尻以代踵。脊以代頭。脾痺。四肢懈惰。發欬嘔汁。上為大塞。此五臟之痺。各以其時重感其入腑者。別有腸痺。胞痺。另詳本門。

於風寒溼之氣也。風勝脈必浮。寒勝脈必澹。溼勝脈必緩。三痺各有所勝。用藥以勝者為主。而兼者佐之。治行痺。散風為主。兼去寒。利溼。參以補血。血行風自滅也。防風治痛痺。溫寒為主。兼疏風。溼。參以益火。辛溫解凝寒也。加減五治著痺。利溼為主。兼去風。逐寒。參以補脾。補氣。土強可勝溼也。川芎、茯苓其症有風溼。羌活、勝公。有寒溼。三痺湯。痺而身寒。如從水中出者。屬寒溼。附子。有溼熱。加味二妙。肩背沉重。肢節疼痛。下注足脛。屬溼熱。當歸拈。有風熱。散。蒼朮散。有暑溼。清暑益。有冷痺。風冷頑麻。有熱痺。熱毒流注骨。清風散。有營熱。加鉤藤湯。去川芎。有營虛。當歸建。有衛虛。防己黃。有氣痺。痺在氣分。有血痺。痺在血分。因勞汗出。臥被風吹。血有瘀。血敗血。歸脾湯。疑於膚黃。青桂枝五物湯。加當歸。

桃紅飲煎有停痰。遍身走痛。二陳湯加羌活。有支飲。冒麻痺。指迷

成入麝香。有在經。木防。有人絡。活絡飲。加桑寄生。威靈。治法總以補助

丸。有在經。已湯。有人絡。仙鉤藤。牛膝。或活絡丹。治法總以補助

真元宜通脈絡。如活血丹。合續斷。使氣血流暢。則痺自己。

風寒溼。氣血凝滯。身重而痛。手足攣急。石頑改定三痺。湯或通痺散。

合痺。真氣不能周於身。渾身痺痛。風寒溼氣客於肉。發內不在臟外。未發皮。命曰周痺。蠲痺湯加桂枝。

白朮。狗脊。薏米。行。偏身走注不定。上半身甚者。烏藥順。下半身甚者。虎骨散。

痺。歷節。攣痛。疏風活。痛甚者。五靈。散。除溼。蠲痛湯。加不應。補中益氣。

著。留著。定處。身重。痠疼。天陰。即發。蠶沙。防己。薏米。不應。湯。加附子。

羌活。黃蘗。

痺即寒痺病痺也。苦痛切骨。安腎丸。

筋痺即風痺也。風熱攻注筋弛脉緩。角散。若淫邪入筋。續斷丹。

麻痺即熱痺也。金匱云。經溼則痺。絡熱則癢。風溼鬱熱經隧為壅。升麻湯去桂麻。

秦凡四物湯。後用人參丸。

肌痺即溼痺若痺也。渾身上下左右麻木屬衛氣不行。神效黃青湯。皮膚

麻木屬肺氣不行。本方去蔓荊。倍黃青。加防風。肌肉麻木屬營氣不行。本方去蔓

荊。加桂枝羌活防風。丹溪曰。麻為氣虛。木為溼痰敗血。

皮邪在皮毛搔如隔帛。或癰疹風瘡宜疏風養血。秦凡地黃湯。

五臟經病入臟邪勝正虛。五痺腎痺。本方加獨活肉桂杜肝痺。本方

加棗仁。心痺。本方加遠志茯苓痺。本方加厚樸枳。肺痺。本方加柴胡。心痺。本方加遠志茯苓。脾痺。本方加厚樸枳。肺痺。本方加

仁麻黃
紫苑。

入門曰痺。初起驟用參耆歸地。則氣鬱滯邪不散。只以行淫流氣。

藥主之久而不愈。宜峻補真陰。使氣血流行。則病邪隨去。參景岳論。

痺與痿相似。但痿屬虛。痺屬實。痿因血虛火盛。肺葉焦而成。痺因

風寒溼邪侵入而成也。痺又為中風之一。然受病各異。痺兼三氣。

邪為陰。受中風邪為陽。受也。尊生書曰。陽者表與上。陰者裏與下也。痺與風痿形症

雖相似。醫治之法可相混乎。沈氏集說。

治痺而用風門通套之劑。弊之過也。痺症非不有風。然風入陰分。

與寒溼互結。擾亂其血脈。致身中之陽不通於陰。故致痺也。古方

多有用麻黃者。以黃能通陽氣。白芷能行營衛。然已入四君四物等

湯中。非尚發表也。至於攻裏。則從無用之者。以攻裏藥皆苦寒。用之則陽愈結。其痺轉入諸腑。而成死症矣。通醫

戴人曰。痺病以溼熱為主。風寒為兼。其脈沈濇。乃治此者不分經絡。表裏臟腑。便作腳氣寒溼治。而用烏附乳沒燥熱。以致便尿濇滯。前後俱閉。虛躁日甚。肌肉日削。飲食不下。雖華扁亦難措手矣。

痺症脈候

脈濇而緊。為痺痛。經脈脈大而濇。為痺。脈急亦為痺。玉機浮濇而緊。風寒溼三氣皆備。訣肺脈微為肺痺。心脈微為心痺。右寸沈而遲濇。為皮痺。左寸結而不流利。為血痺。右關脈舉按皆無力而濇。為肉痺。左關脈弦緊浮沈有力。為筋痺。通醫

附方

防風湯 見一卷溼

加減五積散 見一卷溼

行痺痛痺著痺

川芎茯苓湯 赤苓 桑皮各錢半 川芎 防風 麻黃 炙甘草各五分

棗二枚

羌活勝溼湯 見一卷溼

風溼風溼

史國公酒 羌活 防風 白朮 當歸 牛膝 草薢 杜仲 松節 虎脛骨 酥炙 桑寄生 薤白 秦

芩 善耳子 杞子 白茄根 各味粗研絹袋盛浸 此方去鱉甲 蒼耳子 加龜版 蒼朮名換骨月

附子丸 附 蒼耳子 芍 苓 參 草 朮 桂

寒溼寒溼

苡仁湯 苡仁 歸 芎 薑 桂 羌 獨 防 朮 草

寒濕

三痺湯

地 芍 歸 芎 參 青 苓 草 防 獨
杜仲 牛膝 續斷 桂心 細辛 秦艽 薑

煎 水

加味二妙散

黃蘗酒炒 蒼朮米泔浸炒 名二妙丸 此
加當歸 牛膝 防己 萆薢 龜版

蒼朮散

蒼朮 黃蘗各四兩 虎骨酥炙二兩 防風一兩
為末 每服二錢 白湯下

常歸拈痛散

見一卷溼

消風散

見二卷失音

清暑益氣湯

見一卷暑

巴戟天湯

巴戟二錢 附子 五加皮 石斛 炙草 茯
苓 當歸各一錢 牛膝 萆薢各錢半 肉桂

防風

防己各五分

生薑

水煎

千金犀角散

犀角 鎊二兩 羚羊角 鎊一兩 前胡 黃芩
梔子 大黃 升麻 各用薑汁拌炒五錢 射

熱痺

熱風 熱濕 熱溼 暑濕 冷痺

營熱營虛衛虛氣薄血痺痰停痰支飲經痺

干酒炒黑四錢 豆豉
一升 研末

四物湯 地芍 歸 芩

當歸建中湯 見三卷脾胃

防己黃耆湯 見一卷溼

蠲痺湯 者 歸 芍 羌 防 薑黃各一錢半 甘草五
分 薑五片 棗二枚

黃耆五物湯 者 芍 桂枝各三錢 薑六片 棗二枚
日三服 一方加人參

桃紅飲 桃仁 紅花 川芎 當歸尾 威靈仙 煎好加
麝香少許沖服

二陳湯 見一卷中風

指迷茯苓丸 見二卷痰飲

木防己湯 木防己 石膏 桂枝 薑黃 杏仁 桑枝

絡通痺

活絡飲

木

歸

芎

羌

獨各一錢

甘草五分

薑

活絡丹

川烏

草烏各炮去皮臍

乳香

沒藥各二錢二分

酒

地龍

酒

下

活血丹

熟地三兩

參

木

歸

芎

續斷各一兩

酒

酒

酒

續斷丹

續斷

草薢

牛膝

木瓜

杜仲各二兩

蜜丸

酒

酒

人參散

人參二兩

杜仲

黃耆

棗仁

茯神各一兩

細

酒

酒

辛二錢

丹砂

川芎

熟地

秦朮

羌活各五錢

細

酒

酒

改定三痺湯

防己

防風

草

歸

芎

黃耆

桂心

酒

通痺散

天麻三兩

獨活

藥本

歸

芎

木各二兩

酒

酒

烏藥順氣散

見一卷中風

酒

下

日二服

酒

酒

酒

酒

痺行痺合痺合

補鎮絡經虛補

行痺

虎骨散 虎骨二兩 當歸 乳香 肉桂各一兩 天麻 防風 牛膝 獨活 羌活 各五錢

麝香一錢 每末服二錢

痛痺

疏風活血湯 歸 芎 威靈仙 羌活 白芷 防己 黃蘗 南星 蒼朮 羌活 桂枝各一錢 紅花三分

片薑五

五靈散 五靈脂二兩 川烏兩半 沒藥一兩 乳香五錢

著痺

除溼蠲痺湯 蒼朮二錢 白朮 茯苓 羌活 澤瀉各一錢 陳皮一錢 甘草五分 薑汁 竹瀝各

三匙

補中益氣湯 見一卷中風

著痺

安腎丸 肉桂 川烏各兩半 白茯苓 巴戟 山藥 花

蜜 石斛 萆薢 菰蓉 補骨脂各四兩八錢

骨痺熱痺脈痺鎮補肌痺皮痺五藏

羚羊角散羚羊角 歸芍 防獨 棗仁 茯神 杏

升麻湯升麻三錢 羌活各一錢 茯神 木香 甘草 防風 犀角 羚羊角

秦艽四物湯四物湯加 桂心三分 秦艽 薏苡 蘆沙 甘草

人參丸人參 麥冬 茯神 龍齒 石菖蒲 遠志肉

神效黃耆湯黃耆 參 身熱加丹皮 陳草 蔓荊子 尿瀉加澤

秦艽地黃丸四物湯加 甘草 秦艽 荊防 羌 芷 升麻

五痺湯參 苓 歸 芍 芎 芩 木 五味子 細辛 或

痺

李

左臂自肩以下骨節大痛經所謂寒勝則痛也來勢甚暴若

遊走上下骨節卽俗謂白虎歷節風痛如虎咬刻不可忍此非

厲劑不除投以川烏頭

炮去
臍皮

草烏頭

炮去皮
薑汁製

油松節一劑服後

飲酒以助藥勢達病所夜半身麻汗出平旦而病若失矣此微

活絡丹法

張

五旬外左臂素患腫痛因涉江受風一夜全身麻痺脈虛濡

此真氣虛而風溼爲病乃痺中根萌也經曰營虛則不仁衛虛

則不用營衛失調邪氣乘虛襲入經絡蠲痺湯主之數服而效

○準繩云凡風痺偏枯未有不因真氣不周而病者治不用黃

耑爲君人參歸芍爲臣桂枝鉤藤荆瀝竹瀝薑汁爲佐徒雜烏
附羌活以涸營而耗衛未之能愈也嚴氏蠲痺湯用黃耆炙草
以實衛當歸白芍活血以調營羌防除溼疏風薑黃理血中滯
氣入手足而驅寒溼用酒和服耑藉以行藥力也

王 傷酒涉水溼襲陰絡右腿痺痛由髀骨直至委中穴參用三
痺湯內服桂心茯苓牛膝杜仲白朮蒼朮當歸獨活桑枝煎湯
外用防風桂枝木瓜當歸豨薟蒼朮白煎湯熏洗汗出爲度夫溼
痺重著今腿痛已定通移膝脛仍以逐溼通痺法治川烏桂心
獨活牛膝虎脛骨歸尾沒藥以湯少加茯苓車前子二服兼用
洗藥痛止能行數十日內戒酒肉風冷勞動

王氏女風寒溼合而成痺蘊邪化熱蒸於經絡四肢痺痛筋骨不舒蓋邪中於經爲痺中於絡爲痿金匱云經熱則痺絡熱則痿倘經腑治失宜通延爲痿痺杏仁滑石石膏赤苓威靈仙蠶沙薏仁數服痛減乃用白朮薏仁茯苓桂枝片薑黃釵斛歸身玉竹五加皮桑枝煎湯數十服肢體活動又服九劑平補肝腎步履如常

族婦右臂痛手不能舉此爲肢痺用舒筋湯片薑黃當歸羌活炙草薑渣海桐皮加桂枝四五服漸瘳。凡筋得寒則急得熱則縱纏短爲拘弛長爲痿風寒溼三氣雜至合而成痺風勝爲行痺寒勝爲痛痺溼勝爲著痺宜宣風逐寒燥溼兼通絡如臂通

服舒筋湯必腋下漉漉汗出則邪不滯於筋節而拘急舒矣如
氣虛加參耆血虛加地芍肩背加羌活狗脊鹿膠腰脊加杜仲
獨活沙苑子臂指加薑黃桂枝骨節加油松節虎膝下部加牛
膝薏苡五加皮虎脰骨經絡加桑寄生威靈仙鉤藤久而不痊
必有溼痰敗血瘀滯經絡加桂心膽星川烏地龍紅花桃仁以
搜逐之

主 有年盛暑脈沈緩身半以下痠痛脛膝無汗手足不溫便艱
夢泄皆溼熱壅阻致痺先通其壅用蒸牛膝當歸秦艽川芎玉
竹杏仁陳皮淡薤蓉二服便潤去薤蓉杏仁耑理經絡溼邪加
桂枝桑寄生獨活薏苡杜仲熟地炒十數服全瘳

痿症論治

痿者。肢弱而無力。筋弛而不收。為熱傷血脈之症。經曰。五臟因肺

熱葉焦。發為痿躄。夫五臟皆有痿。如肺熱為皮毛痿。宜犀角心熱

為脈痿。宜鐵粉丸。肝熱為筋痿。宜紫葳湯。脾熱為肉痿。宜二陳湯。腎熱為骨

痿。宜金剛丸。而經論痿躄。必原肺熱者。以肺為臟之長。體燥居上。主氣

而畏火。若金受火燥。則氣傷而不能管攝一身。乃發為痿躄矣。其

治痿。獨取陽明何也。經曰。陽明者。臟腑之海。主潤宗筋。宗筋主束

筋骨而利機關也。陽明虛則宗筋縱。帶脈不引。故足痿不用。此治

痿。必使胃納水穀。化精微。五臟得所稟。以行血氣。濡筋骨。利關節

也。河間論痿。主血衰不能榮養百骸。子和謂痿必火乘金。病多作

於五六月

午為少陰君火之位。未者溼土。庚金伏火之地。申者少陽相火之分。

故病痿者脈浮大

戴人主腎水衰則骨髓枯竭直言痿病無寒丹溪云瀉南方則肺

金清而東方有制土不受戕補北方則心火降而西方有養金不

苦燥凡痿症不可作風治而用風藥東垣治痿以黃為君黃為佐

士材論胃虛食減成痿

宜藷香養胃湯

治脾虛下陷足痿

用補中益氣湯

石頑主

陽明溼熱各具確見今參而酌之通治溼熱成痿脈洪滑者主清

燥

二妙丸加味二妙丸隨症加減

溼熱傷肺成痿者主清上

加沙參麥冬玉竹杏仁石斛百合花松通

草

山溼熱壅胃成痿者主通腑

大豆黃卷茵陳滑石石膏澤熱蒼筋膏車蘇茯苓枳實檳榔

骨成痿者主理隧

金毛狗脊地骨皮知母防己

陽明脈虛宗筋不

約者主潤肺

人參茯苓杞子當歸桑甚肝胃陰虛風動肢癱者主

肉蓯蓉桑寄生芝麻山藥

通攝熱地牛膝遠志肝腎陰虛足熱枯痿者填精髓牛骨髓

肉膠熟地杞子牛膝腎督陽虛脊軟腿痠者壯筋骨鹿角膠太

陽督脈虛形俯痿廢者理腰脊香茸衰年足軟肌麻躄維不用者

以溫行流暢奇絡橘絡木瓜杞子杜仲狗脊病後陰傷骨痿六味

丹澤加虎脛骨久病筋骨痿不起於牀金剛丸牛膝丸燉陰虛挾

溼熱脈滯而數為痿厥虎潛丸加減不長夏暑溼成痿清暑益氣

腎傷暑暍痿厥清燥湯膏粱溼熱傷精脛膝痿弱神龜滋陰丸血

衰筋緩不收補血榮氣虛舉動無力四君湯加半身偏痿須分左

右審氣血陰陽十全大補屈伸不利行步艱難安腎肢軟脈滑腰

膝麻木或腫屬溼痰二朮二陳湯食滯脾氣不得運於四肢成痿

類證治裁 卷之五 痿

脈必氣口弦滑而惡食。木香檳榔丸加山查神麴木瓜防己瘀血留於腰膝成痿脈

必沈澁而兼痛。四物湯加桃仁心熱亢兼實積者為脈痿。大承氣湯瘦

人病痿脈澁或大多血虛有火。二妙四物湯肥人病痿脈滑或沈多氣

虛有痰。二妙六君湯

子和云四末之疾動而或勁為風不仁或痛為痺弱而不用為痿

逆而寒熱為厥風必兼熱痺必風寒淫合邪痿必火乘金厥則或

寒或熱皆從下起奈何不察其源概謂風淫末疾以風藥剋治耶

痿症脈候

脾脈緩甚為痿厥。內診痿躄脈虛者生緊急疾者死。經脈尺脈虛弱

緩澁而緊病為足痛或為痿病。脈訣痿脈多浮而大。和子

附方

肺痿

犀角枯梗湯黃耆 犀角 石斛 天冬 麥冬 百合 山藥

心痿

鐵粉丸鐵粉 銀箔 秦朮 黃連 丹皮 苦參 石蜜 龍膽 龍齒

犀角

肝痿

紫葳湯紫葳 天冬 百合 杜仲 黃芩 黃連 葛根

脾痿

二陳湯陳 苓 夏 草 兔絲子 白蒺藜

腎痿

金剛丸見二卷虛損

胃痿

藿香養胃湯參 朮 苓 草 苡仁 藿香 半夏 麴

脾虛

補中益氣湯見一卷中風

通治

二妙丸見一卷溼

溼熱 加味二妙丸 見本卷痺

溼熱 三妙丸 二妙丸加 酒蒸牛膝二兩

陰虛 滋陰大補丸 熟地 山藥 黃肉 茯苓 牛膝 杜仲 石

菖蒲 杞子 紅棗 蜜丸

陽虛 鹿角膠丸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 人參 當歸 牛膝

壯筋 四斤丸 虎脰骨一兩 兔絲子 白朮 杜仲 虎骨 龜版 天麻

督虛 名加味四斤丸 沒藥 木瓜一觔 爲末以菴蓉搗膏酒糊丸

香茸丸 鹿茸三兩 生當歸二兩 麝香一錢 生川烏五

陰傷 六味湯 見一卷中風

溫理 牛膝丸 見二卷虛損

益陽益陽

煨腎丸 見二卷虛損

五獸三匱丹

鹿茸酥炙 血竭 虎脰骨酥炙 牛膝酒浸
狗脊燒去毛各一兩 其為末此五獸也

附子一个去皮臍去中心入辰砂末一兩填滿木瓜一

不去皮去中心入附子於內以附子末蓋口此三匱也

却以三匱正坐於磁缸內重湯蒸爛

和五獸末搗丸木瓜酒下

虎潛丸 見一卷中風

清暑益氣湯 見一卷暑

痿厥暑痿肺燥

清燥湯 青錢半 蒼朮一錢 陳朮 澤泄各五分 五

地 草 神麴 黃柏 荅 升麻各三分 麥冬 歸

柴胡 黃連各一分 水煎 猪荅各二分

神龜滋陰丸 龍版酥炙四兩 黃蘗 知母各鹽酒炒二兩

為末以猪脊髓和丸 五味 鎮陽酒炙各一兩 乾薑五錢

每服五錢 鹽湯下

滋燥筋痿

大補地黃丸 見一卷燥

補血榮筋丸 菴蓉酒製 兔絲子酒煮焙 天麻煨各二兩 牛膝酒煮四兩 鹿茸酥炙一對 熟地六兩

木瓜薑汁炒 五味子焙各一兩 爲末 蜜丸 溫酒下

四君子湯 見一卷中風

十全大補湯 見一卷中風

安腎丸 見本卷痺

二水二陳湯 見二卷痰飲

木香檳榔丸 木 檳 朮 枳 陳 香附 神麴糊丸

四物湯 見一卷中風

大承氣湯 見一卷溫

氣虛 氣血 陽衰 溼痰 食滯 癰血 熱積

血虛氣虛

一妙四物湯
一妙合四物

一妙六君湯
一妙合六君

痿

補 中年後腎虧火動足膝痠軟脉虛駛而促初用六味湯加懷
牛膝繼用虎潛丸去蠟陽服後甚適但坐久腰腑熱騰小腹收
引氣升腕膈不舒症因衝督經虛龍燄不伏非理臟真所得效
擬龜鹿二仙膏加猪脊髓同熬酒和服得效

李 瘧邪失汗誤藥淫邪入絡四肢痿廢用除淫理絡手足能運
然值冬寒氣血斂滯少腹偏窄背脊拘急脛膝麻木頑步履歪倒
知其陰陽維不司約束浸及任督俱病也用杜仲狗脊強筋骨
而利俯仰五加皮牛膝益肝腎而治拘攣當歸白芍以和營荻
苓車蘼以逐淫秦艽獨活以治痺玉竹桑枝以潤風燥理肢節

加桑寄生通經絡煎服十數劑諸症漸減又將前方參入鹿膠沙苑子小茴香以通治奇脈九服酒下獲痊

族兒脊骨手足痿縱此督脈及宗筋病內經治痿獨取陽明以陽明爲宗筋之會陽明虛則宗筋失養無以束筋骨利機關也童年坐臥風溼虛邪襲入遂致筋脈失司欲除風溼須理督脈兼養宗筋乃效方用歸芎參朮牛膝鹿膠茯苓木瓜寄生桑枝薑黃威靈仙十服肢體運動已活去鹿膠薑黃川芎木瓜威靈仙加杜仲玉竹杞子虎脛骨數十服行立復常

張氏四肢痿弱動履艱難脈濇且弱爲營虛之候經言天癸將絕係太衝脈衰乃陰吹帶濁宿恙頻興因知衝爲血海隸於陽明

陽明虛則衝脈不榮而宗筋弛縱無以束筋骨利機關法當調
補營血以實奇經人參杞子茯苓牛膝酒蒸熟地當歸杜仲
藥炒木瓜薑棗水煎十數服漸愈酒焙山

痛風歷節風論治

痛風痛痺之一症也。其痛有常處。掣者為寒。腫者為溼。汗者為風。

三氣入於經絡。營衛不行。正邪交戰。故痛不止。靈樞謂之賊風。素問謂之痛痺。金匱

謂之歷節。後世更名為虎歷節風。近世俗名箭風。初因寒溼風鬱痺陰分。久則化熱攻痛。

至夜更劇。治以辛溫。疏散寒溼風邪。開發腠理。宜十若痛處赤腫。

熯熱。將成風毒。宜敗毒散。如風溼攻注肢節疼痛。大羌活湯。其歷節風痛無。

定所徧歷骨節痛如虎嘯。又名白虎歷節。蓋痛風之甚者也。或飲

酒當風。汗出浴水。因醉犯房。皆能致之。其手指攣曲。身多痲癩。其

腫如脫。漸至摧落。其痛如掣。不可屈伸。須大作湯丸。不可例以常

劑治。烏頭湯。因於寒宜從溫散。防風天麻湯。因於火宜從清涼。犀角散。

若筋脈攣痛伸縮不利。繫血虛燥。四物湯加木瓜何首烏甘杞子。肢節痠痛。脈沈

短氣。繫有留飲。半夏苓朮湯或導痰湯加減。肢節注痛。得捶摩而緩者。繫風溼

在經。靈仙除痛飲。肢節腫痛。遇陰雨而甚者。繫風溼入絡。虎骨丸沒藥散或虎骨散

肢節煩痛。肩背沉重者。繫溼熱相搏。當歸拈痛散。肢節刺痛。停著不移

者。繫瘀血阻隧。趁痛散。肢節熱痛者。繫陰火灼筋。加味二妙散或潛行散。用四物湯間

服。周身麻痛者。繫氣血凝滯。五靈丸。歷節久痛者。繫邪毒停留。乳香定痛

丸。活。肥人肢節痛。多風溼痰飲流注。宜導痰湯。瘦人肢節痛。是血枯。宜四

物湯加羌活。老人性急作勞。患腿痛。宜四物湯加桃仁牛膝陳皮生甘草煎成入薑汁或潛行散

瘀積者。加熱酒服。風氣遊行。痛無常處。如蟲行遍體。日靜夜劇者。

并刺委中穴出血。風氣遊行。痛無常處。如蟲行遍體。日靜夜劇者。麝香丸。痛風歷節二症。宜參酌治之。

東垣以痛風多屬血虛。主用芎歸。佐以桃仁紅花薄桂威靈仙或趁痛散。丹溪以痛風先由血熱。主用四物。黃芩白芷。在上加羌活桂枝威靈仙桔梗。在下加牛膝防己。黃藥木通。石頑以溼熱挾痰挾血入絡痺痛症重日久必加烏附驅逐痰溼壯氣行經。便阻必用大黃。或畏峻攻不知邪毒流注經絡。非烏附不能散結。燥熱結滯腸胃。非硝黃豈能潤燥乎。

痛風脈候

金匱云。寸口脈沈而弱。沈即主骨。弱即主節。沈即為腎。弱即為肝。汗出入水。歷節黃汗出。故名歷節。

附方

痛風 十生丹 歸芍 羌防 獨天麻 川烏 草烏 何首烏 海桐皮 等分 蜜丸 茶下一錢

風毒敗毒散 見一卷傷風

大羌活湯 羌活 升麻各錢半 獨活一錢 威靈仙 蒼

烏頭湯 麻黃六錢 黃耆 白芍各三錢 炙草一錢 川

防風天麻湯 歸芍 羌活 防 荆 芷 天麻 草烏

犀角散 犀角 羚羊角 前胡 黃芩 梔子 大黃 升

四物湯 地 芍 歸 芎

半夏苓朮湯 蒼朮二錢 白朮一錢半 半夏 南星 黃

靈仙 甘草 香附各一錢 陳皮 赤苓各五分 威

導痰湯 見一卷中風

靈仙除疳飲 麻黃 赤芍各一錢 荆 防 羌 獨 苓

歸 芎 芷 枳 草 蒼朮 靈仙各八分

去痰風溼

清涼血燥 飲

風溼風溼風溼

虎骨丸

虎骨 烏頭一兩半 五靈脂

白膠 酒糊丸

礬石

威靈仙各一兩

沒藥散

沒藥 虎骨

等分爲末

酒下二錢

虎骨散

虎脛骨 當歸

防風 龜版

血竭

沒藥

自然銅

赤芍

白芷

骨碎補

天麻

研末服

當歸拈痛散

見一卷溼

溼熱痰血

趁痛散

桃仁 紅花

香附 當歸

地龍 甘草各二錢

乳

五靈脂

牛膝

爲末

酒下二錢

加味二妙散

見本卷痺

潛行散

黃蘗酒浸焙研

每一錢薑汁和酒調服

陰火陰火血滯

五靈丸

見本卷痺

久痛行絡風氣

乳香定痛丸

薤白二兩 乳

沒各三錢

歸芎各二兩

丁香五

活絡丹

見本卷痺

麝香丸

川烏二个 二錢半

麝香一字 全蠍廿一个

糯米糊丸 菜豆大 酒下 七九

痛風

房弟脛膝痛腫流走不定筋惕足痠風溼久痺都從熱化矣古謂風從陽受痺從陰受始山絡痺失宣十數年忽止忽發今秋痛自右移左行立頗難陰絡受病診脈下元先虛搜理絡邪宜兼滋化源爲有年陰虛痺症治法熟地水煮杞子當歸牛膝茯苓木瓜威靈仙桑寄生玉竹獨活杜仲生薏苡地骨皮同熬膏以虎脛骨膠收開水化服痛止

族某水溼與氣互搏走注上下表裏經絡不定其走注處必畧腫膚熱如芒刺前自耳項直下胸鄉汨汨走腸別注莖囊後自背脊走腰注臀行髀膝至右脰腫重手按不卽起口燥咽痛溺少

便艱此淫飲爲風氣鼓動溢於支絡游走升降腸腑鬱痺鍼刺罔效治用表裏宣泄杏仁石膏山梔赤苓木通秦艽黑豆皮大腹皮黃蘗酒炒二服痺痛減二便爽再用宣理行痺鉤藤薏苡錢三山梔杏仁車前錢一茯苓腹皮川棟子桑寄生錢二牛膝狗脊防己錢四服諸症平再去牛膝狗脊川棟等加神薏半夏椒目以運水溼而腫退

脹 長夏歷節痛痺身重肢輓風溼淫注血脈失於宣通治用驅

風逐淫通調血脈獨活川烏製當歸牛膝蒸薑黃威靈仙防己

松節乳香桑枝尋骨風水酒各半煎外用風藥煎湯熏洗而康

族女風溼走注骨節痛痺四肢筋掣脈沈由產後血虛留邪當歸

木瓜秦艽杞子鉤藤茯苓牛膝薏苡蠶沙薑黃桑枝外用防風
蒲黃蒼耳子菖蒲根葱薑煎湯浴取汗六七次痛止如常

麻木論治

麻木營衛滯而不行之症。

靈樞云：衛氣不行則為麻木。素問云：營氣虛則不仁，衛氣虛則不用。營衛俱虛

則不仁。如人坐久壓著一邊，亦為麻木。東垣以為氣不行，當補肺

氣。丹溪以麻木為氣虛，木為溼痰敗血，於不仁中確分為二。蓋麻雖

不關痛癢，只氣虛而風痰奏之。如風翔浪沸，木則肌肉頑痺，溼痰

挾敗血阻滯陽氣，不能徧運，為病較甚。俱分久暫治之。治麻以氣

虛為本，風痰為標。用生薑為嚮導，枳殼開氣，半夏逐痰，羌活散風，木通威

靈行經絡。手臂用桑枝足股用牛膝，病減用補中益氣湯，以固本。治木

以桂為嚮導。烏藥、木香、行氣、當歸、杞子、和血、穿山甲、通經絡，病減用八

湯。以培虛。此外如渾身麻木，衛氣不行者，神效黃皮膏。麻木肺氣

麻木

不行者。芍藥湯。加防風。肌肉麻木營氣不行者。八仙。暑月麻木熱傷元

氣者。人參益氣湯。冷風麻痺足屈不伸者。獨活寄腿足麻木忽如火灼

屬溼熱下注。二妙丸。加牛膝。手臂麻木氣虛。補中益氣湯。加桑枝。

春臂麻木目淚。為氣虛有痰。用補十。指麻木。歸胃中溼痰敗血。二陳

湯。加桃仁。紅花。兼服六味丸而愈。沈氏桑面麻木。歸陽氣虛。牛皮

少加附子。行經指尖。麻屬經氣虛。尖湯。面麻木。歸陽氣虛。膠煨

化。和肉桂。口舌麻木。吐痰涎。止麻消痰湯。氣虛加。合日則渾身麻

末厚塗之。舌麻木。吐痰涎。人參。血虛加當歸身。合日則渾身麻

木開眼則止。東垣以為陽衰溼伏陰分。頭加黃蘗。去烏腹。皮麻痺

多煮葱白。一塊。不知痛癢。遇陰寒益甚。屬痰挾死血。宜活血行氣

食之即愈。二陳湯。加川芎。當歸。懷牛膝。韭。因血。痰。四物湯。加韭。因氣。滯

開結。舒筋湯。有自頭麻至心窩而死。或自足心麻至膝蓋而死。方。麻骨婦

人因悒鬱氣結致發麻痺者當舒鬱逍遙散加香附川芎沈氏尊生書曰治

麻木須補助氣血不可專用消散方書有謂大指次指忽然麻木

不仁者三年內須防中風宜服地黃飲子或十全大補湯加羌活秦艽若古法服風

湯天開其元腑通其真液適以招風取中預防云乎哉

麻木脈候

脈浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體浮而緩屬溼為麻痺緊屬寒為痛痺濡而芤屬死血為木不知痛癢

附方

治麻 補中益氣湯 見一卷中風

治木 八珍湯 見一卷中風

氣肺氣營氣清暑

冷風溼熱腎麻指麻

神效黃耆湯 參 耆 陳 芎 草 蔓荊子

芍藥補氣湯 耆 芎 陳 草

八仙湯 八珍湯加 陳 夏 羌 防 柴胡 桂枝 秦

人參益氣湯 耆二錢 參 草各錢半 白芎七分 柴胡

第二日耆四錢 紅花三分半 陳皮五分 澤瀉三分 亦

一錢 澤瀉錢二分 耆三錢 黃藥六分 陳皮錢半 升麻

三十五粒 亦日二服 白芎二錢半 炙草五分 五味子

獨活寄生湯 見一卷溼

二妙丸 見一卷溼

六味丸 見一卷中風

二水二陳湯

見二卷痰飲

指尖

桑尖湯

嫩桑尖五錢 茯苓各一錢半

漢防己三錢

當歸二錢

黃耆

升麻各五分 加人參亦可

止麻消痰湯

芩 連 芩

天麻 南星

夏 薑 細辛

桔

陳

枳

草

三痺湯

見本卷痺

二陳湯

見一卷中風

回物湯

見一卷中風

開結舒筋湯

紫蘇 陳皮

夏 星 蒼朮

香附 各八分

烏藥

歸

芍

羌

麻骨湯

人糞燒灰 為末 每服二五錢

豆腐漿調服即止

酒下

桂枝

又方

川楝子

燒灰

逍遙散

見一卷火

地黃飲子

見一卷中風

口舌合目行氣血瘀氣滯頭足舒鬱中風

補虛通治諸風

十全大補湯 見一卷中風

愈風湯 見一卷中風

天麻丸 天麻 牛膝 草薢 元參各六兩 當歸 羌活
各十兩 杜仲七兩 熟地一觔 附子三兩 煉

蜜爲丸

麻木

陸氏年近六旬肢麻頭暈屢發今春頭右畔麻至舌尖言蹇目紅
齟浮齒痛厥陽升逆鼓颞痰火入竅入絡輕爲麻督甚則口眼
喎僻手足不隨偏枯類中由來者漸矣用滋陰鎮陽以熄風緩
效爲宜熟地四錢鉤藤三錢石斛杞子茯神白芍牡蠣磁石各二錢 羚羊角七分山梔甘菊俱炒各一錢十數服症減去磁石加冬桑葉黑芝
麻再去鉤藤梔菊羚羊角等加潞參以桑甚熬膏及阿膠和丸漸
安

瘧症論治

瘧症體勁直而背反張病在筋也。筋者血之所榮。傷於邪則成瘧。經曰。諸瘧項強。皆屬於溼。亦有因寒。因風。而分剛瘧柔瘧者。有誤汗。誤下。而致瘧者。有瘡家發汗。而瘧者。有中風暴仆。而瘧者。有產後亡血。而瘧者。有小兒急慢驚。而瘧者。有破傷風。溼變瘧者。有暴病。忽見口噤。頭搖。戴眼。反折者。皆瘧病也。其症身熱足寒。項強。齒噤。手足抽掣。角弓反張。脈皆沈伏。弦緊。其因多由血液虛燥。筋脈失榮。風寒溼熱之邪。得以襲入經絡。而爲病。此陳無擇。薛立齋。張介賓。諸賢。所以切指瘧爲亡血陰虛也。故宜滋營液。以治本。疏風溼。以治標。症屬表者。如金匱云。太陽病發熱無汗。反惡寒。爲剛瘧。

葛根湯。太陽病發熱汗出不惡寒為柔痙。枯蕒桂枝湯屬裏者痙病胸

滿口噤卧不著席脚攣急必齟齬屬陽明若便鞭。可與大承氣湯屬半表

半裏者如醫通云一邊牽搐一眼喎斜屬少陽若往來寒熱。小柴胡湯

加桂枝。此三陽痙也。若三陰痙俱手足厥冷筋脈拘急汗出項強。參附湯加

脈沈太陰則四肢不收。水附湯加甘草生薑少陰則閉目合面。

陰則頭搖口噤。當歸肉桂。此三陰痙也其血虛發痙。宜大血虛挾

火必脈洪煩熱。一陰煎。火盛則陰血燥涸。保陰煎。液虛汗多。宜三

汗多兼火。當歸六。痰火發痙。枯蕒枳實湯。風熱痰壅發痙。祛風導嘔瀉

發痙。胃關煎或溫胃飲。身冷痙厥脈沈細。參附湯。暑風搐搦成痙。三物

湯加羌活防風黃耆白芍。溫邪劫液成痙。復脈湯。產後血虛汗多成痙。十全大

應急加附子。三因用
小續命湯宜去麻黃。

陳無擇曰。寒滯血。故無汗而惡寒。爲剛瘧。風散氣。故有汗而不惡
寒。爲柔瘧。原其所因。多出亡血。筋失所榮。故邪得襲之。徐忠可曰。
發熱惡寒無汗。本傷寒症。若成瘧。是太陽寒溼相搏而侵少陰。故
惡寒。寒性勁。故曰剛。發熱有汗。不惡寒。本傷風而併陽明症。若成
瘧。是太陽陽明傷溼。兼風。風性溫。故曰柔。仲景以葛根湯治剛瘧。
杜太陽項強。漸成陽明。胸滿之勢也。以桔梗桂枝湯治柔瘧。潤太
陽。既耗之液。使經氣通。散風行溼也。以大承氣湯治裏症。以熱邪
入內。故直攻其胃而邪散也。

薛立齋曰。瘧以有汗無汗辨剛柔。又以脈逆不厥逆辨陰陽。仲景

雖曰痙皆身熱足寒然陽症不厥逆其厥逆者皆陰症也

張介賓曰筋脈拘急故反張血液枯燥故筋攣觀仲景云太陽病發汗太多則致痙風病下之則成痙瘡家不可發汗汗之則痙可知誤汗傷液誤下傷陰陰液傷而筋失所滋也如中風之痙必年力衰殘陰之敗也產婦之痙必去血過多衝任竭也潰瘍之痙必血隨膿化營氣涸也小兒之痙或風熱傷陰爲急驚或吐瀉亡陰爲慢驚此雖不因誤治而總屬陰虛之症治此者先以氣血爲主邪甚者或兼治邪若邪微則急培元氣元氣復血脈自行微邪自去若從風治難乎免矣

丹溪曰痙與癇相似而不同癇病身軟時甦痙病身強直不時甦

甚有昏冒而遂亡者。

瘧症脈候

太陽病發熱脈沈而細名曰瘧。爲難治。瘧脈按之緊如弦。直上下行。瘧病發其汗已其脈如蛇。腹暴脹大者爲欲解。脈如故反伏弦者瘧。瘧脈皆沈伏弦緊。但陽緩陰急則久久拘攣。陰緩陽急則反張強直。二症各異不可不別。三因

附方

葛根湯 見二卷汗

栝蒌桂枝湯 見四卷瘧 加栝蒌

大承氣湯 見一卷溫

直和太陰少陰厥陰血虛兼火盛火盛火多汗兼火
小柴胡湯 見一卷溫

木附湯 木附 草薑

參附湯 參附 薑

耆附湯 耆附 薑

大營煎 見三卷關格

一陰煎 見二卷欬嗽

保陰煎 二地 白芍各二錢 山藥 續斷 黃芩 黃蘗
各錢半 生甘草一錢

玉女煎 見一卷溫

三陰煎 見二卷汗

當歸六黃湯 見二卷衄血

痰火風痰嘔瀉吐瀉產後暑風溫邪祛風

枯藁枳實湯

黃歸

枳實

貝

桔

參

茶

陳

苓

祛風導痰湯

導痰湯

見一卷中風

蘇子

此再加

羌

防

朮

胃關煎

熟地

山藥各三錢

扁豆

白朮各二錢

薑

草各一錢

菜黃五分

薑

溫胃飲

見一卷中風

十全大補湯

見一卷中風

三物香薷飲


見一卷中風

復脈湯

見一卷中風

小續命湯

見一卷中風



痙

服姪少陰伏邪夏至後發協熱下利口乾脈數舌絳目紅譫煩躁
擾服蔗梨西瓜等汁轉益狂躁神昏不寐症由心營受燥勢必
液涸成痙先用鮮菖蒲根湯下至寶丹開竅滌痰二服神識畧
清但指臂動掣脛膝不溫痙厥已露腎分齒噤口喎搖頭直視
此火風入筋劫燥血液熱深厥深之象急救營液以熄火風用
阿膠水化生地犀角汁麥冬鉤藤木瓜山梔石斛生藕汁煎日再
服症定脈數減去犀角加生鼈甲龍膽草耑退肝膽風熱漸平
同時一姪孫症同脈更沈數飲以臘雪湯西瓜汁暫定逾時輒
復躁擾譫妄服至寶丹稍靜予一見其舌乾薄齒如灰糕決其

腎水枯竭勉用方諸水煎生地犀角生龜甲元參石斛等熱勢
輒定然卒不救可知溫熱症由伏邪內發者多死於陰虛水涸
之體也

眩暈論治

頭爲諸陽之會。煩勞傷陽。陽升風動。上擾顛頂。耳目乃清空之竅。風陽旋沸。斯眩暈作焉。良由肝膽乃風木之臟。相火內寄。其性主動主升。或由身心過動。或由情志鬱勃。或由地氣上騰。或由冬藏不密。或由高年腎液已衰。水不涵木。或由病後精神未復。陰不吸陽。以至目昏耳鳴。震眩不定。甚則心悸舌辣。肢麻筋惕。寤不成寐。動卽自汗。起則嘔痰。無痰不作眩。此經所謂諸風眩掉。皆屬於肝也。顧內風肆橫。虛陽上升。非發散可解。非沈寒可清。與治六氣風火大異。法宜辛甘化風。或甘酸化陰。葉氏所謂緩肝之急。以熄風滋腎之液。以驅熱。肝風旣平。眩暈斯止。條其治法如上。焦竑絡火鬱用。

羚羊角、山梔、連翹、天花粉，以泄熱從膽治也。如中虛風陽擾胃，用丹皮、生地、桑葉、鉤藤、天麻，以平肝風內擾，陽明正如下元水人參、山藥、黃耆、小麥、炙甘草、龍眼肉，以填補從胃治也。當其衝，故須補中。如下元水涸火升，用阿膠、熟地、石斛、何首烏、杞子，以攝納從肝腎治也。其陽目不潛，用牡蠣、淡菜、龜甲、療多作眩，用茯苓、川貝、橘紅、竹瀝、薑汁，心悸不寐，用冬、茯神、龍厥陽不斂，用黃肉、白芍、土被木克，嘔吐不食，宜泄肝安胃，用白木瓜、半夏、動怒鬱勃，痰火風交熾，用二陳湯。下至於熄風之品，如龜板、苧、甘菊、炭、煨之屬，皆可隨症加入者也。天麻、鉤藤。

附方

二陳湯 見一卷中風

除痰

龍薈丸 見一卷火

火瀉

眩暈

褚氏高年頭暈冬初因怒猝發先怔忡而眩仆汗多如洗夜不能寐左寸關脈浮大無倫此膽氣鬱勃煽動君火虛陽化風上冒巔頂所致用丹皮山梔各錢半甘菊白芍俱炒各三錢鉤藤茯神各三錢柏子仁棗仁生研各八分桑葉二錢浮小麥二兩南棗四枚二服悸眩平汗止熟寐矣隨用熟地潞參五味茯神麥冬蓮子白芍數服全愈。凡營液虛膽火上升蒙竅須丹梔鉤藤桑葉以泄熱炒菊芍以熄風和陽再加茯神棗仁柏子仁小麥以安神涼心風靜汗止必收斂營液爲宜。

豐氏眩暈痞嘔多酸苦濁沫肝木乘土胃虛食減痰濁不降得虛

風翔則傾溢而出厥陽上冒清竅爲蒙故眩暈時作診脈濇小
數兩寸尤甚先用降濁熄風栝實霜蘇子半夏茯苓杏仁天麻
甘菊炭鉤藤橘皮諸症平思納食矣又照原方去蘇子杏仁鉤
藤加茯神蓮子釵石斛荷葉煎湯十數服而安

室人煩勞傷陽無寐耳鳴頭暈欲嘔伏枕稍定虛陽上顛風動痰
升眩嘔乃作宜潛陽熄風牡蠣煅研白芍五味甘菊炭天麻煨半

夏青鹽生地炒茯神棗仁桑葉二服隨愈

蕭勞力先曾失血數次近日頭眩耳鳴目昏心悸腕悶兩尺浮
大弦勁相火易炎龍雷失制痰隨火乘上干清竅所謂無痰不
作眩悸也養陰潛湯淡菜牡蠣熟地炭石斛甘菊白芍貝母茯

數服得效後宜服六味丸

許氏 中年經行太多目眩頭暈用攝陰和陽熟地白芍甘草俱炒

各二錢 當歸醋炒 丹皮 牡蠣粉各錢半 甘草炙黑一錢 嫩桑葉三錢 紅棗三枚

二服愈

王 伏暑病後失調脈虛疾頭暈熱渴而煩虛風上竄譫苦辛泄

熱佐以甘潤山梔甘菊丹皮麥冬釵斛天麻煨 黨參花粉甘草

嫩桑葉二服而愈

堂兄寤後舌辣津不上朝頭眩肢麻陽升風動主和陽熄風佐酸

味以生津鮮生地玉竹石斛白芍五味花粉烏梅甘菊炭牡蠣

粉桑枝黑芝麻常服効

姜 弱冠努力傷陽神疲頭眩發熱口苦食減嘔渴兩寸脈數厥

氣上冒有風翔浪湧之勢治以鎮陽泄濁牡蠣白芍茯神橘紅

製半夏吳茱萸甘菊炭金器同煎二服渴降嘔止脈仍小數頭

目不清緣春溫膽火上升倣葉氏泄膽熱法丹皮嫩桑葉荷葉

邊鉤藤白芍

生

山梔生地炭數服眩除熱減去桑葉生地炭加

玉竹茯神杞子

焙

山藥熟地

俱炒

路參蓮棗脈平

蕭

冒雨後溼鬱成熟蒸而爲黃宿恙又經操勞屢次失血當春

虛陽升動欬而頭眩口乾目黃怔忡失眠治先清泄火風生地

石斛山梔心茯神丹皮羚羊角杏仁鉤藤甘菊

炒

四服頭目清

怔忡息食進寐穩矣但神疲力倦去生地加參芍蓮棗以扶脾

元數服更通後去羚羊角杏仁鉤藤甘菊加茵陳松蘿茶葉黃
漸退

厥症論治

氣自下逆上手足冷爲厥。厥者盡也。危候也。經曰：下虛則厥。故陽衰於下，則爲寒厥；陰衰於下，則爲熱厥。陰陽之氣不相順接，則病厥逆。手之三陰三陽相接於手十指，足之三陰三陽相接於足十指。陽氣內陷，陽不與陰相順接，故手足厥冷也。寒厥者，身寒而青，四肢逆冷，指甲冷，踰臥不渴，便利，脈微遲，卽陰厥也。熱厥者，身熱而赤，四肢厥逆，指甲煖，煩渴，昏冒，便短，濇脈滑數，卽陽厥也。按內經論十二經陰陽之厥詳矣，而仲景以厥隸厥陰，活人亦謂諸手足逆冷皆屬厥陰，以肝臟風火爲厥逆之主。故厥症種種類由肝風痰火衝激閉塞，以至昏瘈爲多。今標舉其目有寒熱氣血食痰尸虵煎薄痿痺風癰瘡鬱骨痛腎色暴瘡諸厥施治。

最所宜審寒厥初病卽肢冷腹痛脈微附子理中湯或表熱裏寒下利

清穀厥逆乾嘔咽痛脈沈細而微四逆湯獨指尖冷名清厥理中湯熱

厥初病身熱煩躁脈滑數日後忽肢冷乍溫乃熱深發厥火鬱湯便

秘大柴胡湯煩渴躁妄失下而手足冷乃陽極似陰熱極似寒不可疑

作陰症輕用熱藥熱微厥亦微四逆散熱深厥亦深承氣湯如陰衰於

下足下熱而厥者六味湯凡傷寒之厥辨邪氣寒厥宜溫熱厥可散

可攻若由陰陽之衰則元氣爲重寒厥宜補陽熱厥宜補陰氣厥

症有二氣虛氣實皆能致厥氣虛而厥者必形色消索身微冷脈

微弱爲氣脫參耆歸朮地黃枸杞之屬甚者回陽飲氣實而厥者形色鬱勃脈

沈弦而滑胸膈喘滿爲氣逆先理其氣四七湯再隨症調之血厥

排氣飲

症有二。血脫血逆皆能致厥。吐衄暴崩及產後血大脫則氣隨之。

故猝仆宜先掐人中。或燒醋炭以收其氣。急煎人參湯。但氣不盡

脫必漸甦。血逆者暴怒傷陰。血逆於上。先理其氣。則血自行。通痰

煎。俟血行氣舒。隨症調之。食厥由醉飽過度。偶感風寒。惱怒食氣

填中。脾陽不運。忽仆不省。誤作中風。中氣治則死。煎薑鹽。食出則

愈。如感風寒。藿香正氣散。傷氣滯。八味順氣散。縱飲痰升。猝仆者。名酒厥。二

湯加青皮。痰厥由痰熱阻蔽心胞。肢冷猝仆。先探吐其痰。瓜蒂散。痰

開再治本病。火痰宜清降。寒痰宜溫散。溼痰宜燥利。因脾虛者健

脾。因腎虛者補腎。尸厥卽中惡之候。因犯不正之氣。忽手足厥冷。

牙緊口噤。昏不知人。或由登塚弔死。飛尸鬼擊。語妄面青。蘇合香湯灌之

卷之三

候甦。服調氣仲景云尸厥脈動無氣氣閉不通者。還魂丹。虻厥多因

胃寒。虻蟲攻胃。心腹痛不可忍。或吐涎沫。或吐蛔蟲。發有休止。不

宜用寒藥。理中湯加炒川椒。檳榔水煎下。烏梅丸。或安虻散。蕪荑散。症。口瘡咽疼。吐虻竟以冷劑煎厥者。諸動屬陽。煩勞則陽氣暴張。

取效者。不可端以胃冷概也。勞火亢炎而精絕。遷延至夏。內外皆熱。孤陽厥逆。如煎如熬。宜清

心益腎。或鹹寒降逆。人參固本丸。即淡菜。阿膠。方諸水。薄厥者。肝本藏血。怒則火

起於肝。迫血上行而厥。蒲黃酒降之。痿厥亦熱厥症。厥從肝起。致四末

不用。因水虧則陽風燥。筋絡熱沸騰。須血肉鹹潤之品。熬膏服。以

填其隙。龜甲。龜板。阿膠。淡菜。生地。猪羊脊髓。痺厥。腳氣頑麻。初發必身痛。肢節腫。當

拈痛。其自踝以下痛極者。五獸三匱丸滋腎丸。風厥。手足搐搦。身體強直。名

散。

瘕厥小續命湯癰厥肝風發瘕肢掣液涸固本丸加阿膠瘡厥乃類中

風症暴瘖不語經所謂內奪而厥則為瘖瘵地黃飲子加減瘕厥亦血厥

症平居無疾忽默默無知目閉口噤惡聞人聲移時方寤由熱升

風動鬱胃而厥婦人多有之羚羊散虛則填補奇經杞子當歸鹿角霜茯苓肉苁蓉

骨厥骨枯爪痛六味丸痛厥由胃陽久衰肝木來乘濁氣攻胃吳萸半裏

茯苓薑汁腎厥火山背脊上升肢逆吐沫椒附湯其有腎厥氣逆至

廣皮之屬玉真色厥乃縱慾竭情精脫於下氣脫於上獨參湯

顛頭腦大痛玉真色厥乃縱慾竭情精脫於下氣脫於上獨參湯

厥脈至如喘氣閉肢冷若鼻及心腹微溫目中神采不變口無涎

卵不縮皆可救備急瘕厥山瘕邪陷陰發厥不省當和正以托邪

人參半夏知母草凡諸厥脈大浮洪有力易醒脈細沈伏數急不

果烏梅生薑之屬厥

連貫凶厥仆大指掐拳內凶掐拳外輕面青環口青唇白鼻青孔
黑人中弔危也。

諸厥脈候

寸脈沈大而滑沈爲實滑爲氣實氣相搏猝厥血氣入臟卽死入
腑卽愈唇青身冷爲入藏身溫汗出爲入腑猝厥脈大而緩者生緊大而浮者死尸
厥脈伏者死凡厥脈沈微爲寒沈數爲熱細爲氣虛芤大血虛浮
數滑爲痰脈至如喘爲氣沈滑緊疾爲食積大而滑爲虵脾脈緩
爲痿浮濇而緊爲痺。

附方

寒
理中湯 見一卷中風

寒厥 四逆湯 見一卷暑

熱厥 火鬱湯 見一卷火

便厥 大柴胡湯 見一卷溫

秘散 四逆散 見三卷肝火

熱蕩 小承氣湯 見一卷溫

滋陰 六味湯 見一卷中風

補陽 補中益氣湯 見一卷中風

氣脫 四味回陽飲 參附 蓮草

逆氣 四七湯 一名七氣湯 見二卷欬嗽

逆氣 排氣飲 見三卷積聚

血逆 怒傷 霍亂 氣滯 酒厥 吐痰 尸厥 尸厥 氣閉 止虻

通瘀煎

歸尾 澤瀉

山查

香附

紅花

烏藥

青皮

木香

化肝煎

見一卷血

正氣散

見一卷中風

八味順氣散

見一卷中風

二陳湯

見一卷中風

瓜蒂散

見一卷中風

蘇合香丸

見一卷中風

調氣平胃散

見一卷中風

還魂丹

辰砂 雄黃 玳瑁 麝香
化爲丸黍米大 每服五分

烏梅丸

見三卷嘔吐

白芥子

安息香鎔

止虻散 見三卷嘔吐

殺虻散 見三卷積聚

煎魚固本丸 見一卷中風

薄蒲黃酒 蒲黃一兩炒褐色 清酒十盃沃之溫服

痺當歸拈痛湯 見一卷淫

痺五獸三匱丸 見本卷痿

瀉滋腎丸 見一卷火

熱小續命湯 見一卷中風

風地黃飲子 見一卷中風

疔瘡拾羊角散 見本卷痺

腎厥頭痛暴厥

椒附湯

見四卷泄瀉

玉真丸

硫黃

硝石

石膏

半夏

黃日糊丸

備急丸

大黃

乾薑

巴霜各二兩

蜜丸豆大

猝厥者

酒下三丸卽活

厥

房叔秋感時癘煩悶吐瀉筋掣囊縮手足厥逆脈微邪陷厥陰與
六和湯去扁豆白朮杏仁加吳茱萸煨薑吐瀉止手足溫忽發
瘕項背強直時或反張頭面冷至胸背躁擾欲冷飲目閉心丁
了口不能語由吐瀉後真陰大傷厥氣上逆陰陽失交虛風入
絡故現瘕厥重症雖神明未昏而腎水欲枯微陽垂絕勉用參
二附三回陽歸二芍三錢救陰麥冬錢五分生津木瓜鉤藤各
錢分舒筋茯神遠志各二錢斂神服後陽回躁定再劑諸症悉退

類證

卷之五

四

聖

腳氣論治

腳氣壅疾也。多由蘊溼而成。經所謂緩風溼痺也。頑弱爲緩風。痛著爲溼痺。然

有風溼、寒溼、熱風、逆攻、注等因。東垣謂南方多感寒溼，北方多

傷溼熱。千金方直謂風毒所中。由坐立溼地。風溼襲人經絡皮肉。

遂成腳氣。初起甚微。人多不覺。惟猝起腳屈弱。不能動。或腫不腫。

或頑痺。或緩縱。或攣急。其發也。身痛壯熱。大類傷寒。或小腹不仁。

或腹痛下利。或二便秘濇。或忡悸昏憤。嘔逆轉筋。但病起自腳。或

腫滿。或枯細。便作腳氣治。勿用傷寒等藥。其小腹頑痺不仁者。腳

多不腫。頑後三日。令人嘔吐。爲腳氣入心。死在旦夕。腎乘心。水克火也。丹溪以

入味尤去。後人又以浮腫爲溼。腳氣當利溼疏風。不腫爲乾。腳氣

當潤血清燥。乾自治法大要疏通其壅氣滯者。橫痃。食滯者。黃

湯。風勝者。自汗走注。脈浮弦。越婢加寒勝者。無汗。攣急。掣痛。脈沈

濇。酒下牛。暑勝者。身熱渴煩。脈洪數。清暑益。溼勝者。腫痛重者。脈

濡細。除溼。寒溼勝者。頑弱無力。脈細緩。巴九。熱甚者。加味蒼。腫甚

者。勝。餅子。肺氣初發。渾身痛。肢節腫。二便秘。先用。羌活導滯。後

川。散。歸。拈。痛。風毒甚。頭痛。身熱。肢節痛。或一腳偏軟。小續命湯。三

陽經熱毒。注。腳踝。赤腫痛。寒熱如瘧。敗毒散。三陰經寒。溼著。脛

膝。枯瘦。色淡。少腹不仁。或腹急痛。上氣喘急。八味丸。腳氣入腹。衝

胸欲絕。千金半。入脇作痞。杉木。肺氣衝心。為火氣逆上。金鈴子散。

以附子末。津。衝心滿痛。二便俱阻。沈香導。腹脹喘急。蘇子降氣湯。別

調敷湧泉穴。氣湯。腹脹喘急。佐以養正丹。

嘔逆惡心

平胃散加木香

腰肚轉筋

以蒜擦足心令熱即其厥氣升溼濁安仍以冷水食一盞

不降

木黃湯

腎氣虛小溲不利

金匱腎氣丸

氣血虛屈伸不利

獨活寄生湯羌活續斷

腳氣走注痛不可忍

提虎骨節腫痛

五加皮丸

腿筋不舒

湯

上攻便秘

三將軍丸

腹脹喘急

威靈仙末二錢酒下

足腫成瘡

沈氏腳氣湯

溼瘡蟲癢

甘蔗渣燒灰生猪脂搗敷油紙扎效

注踝成漏

人中白煅研數孔良

此症最忌房室及一切牛

羊雞鴨魚肉葱蒜酒麪犯之則成癰疾

東垣云腳氣實由水溼然有二焉南方卑溼清溼襲虛則病起於

下此為外感北方常食羶乳飲酒太過脾胃不能運化水溼下注

此因內至外者也。腳氣腫是為壅疾治當疏下然太過則損

脾不及則病不去南方多見兩足粗大與疾偕老初起治宜

續命湯

並加橫櫛以宣通其氣。不使其壅。壅既成。砭去惡血。然後服藥。
千金論云。腳氣有冷有熱。不同者。足有三陰三陽。寒中三陽。所患
必冷。暑中三陰。所患必熱。脾受陽毒。必熱。頑腎受陰淫。即寒痺。
活人書云。凡腳氣服補藥。及用湯藥。漂洗。通邪入於經絡者。皆醫
之大戒也。

醫通云。腳氣服補藥太過。小便不通者。用蓮汁炒山梔。木通。赤芍。
時煎。腳氣遍身腫滿。喘促煩悶者。木通散。腳氣上入少腹。不仁者。八
丸。

凡腳氣多從暑淫得之。故腫痛多屬淫熱。其兼寒兼風。當詳春夏
病因。六淫治之。至於枯細而熱者。屬陰虛。瘦弱而寒者。屬陽虛。當

別以本症治之

腳氣脈候

腳氣之脈。浮弦爲風。濡弱爲溼。遲澀因寒。洪數熱鬱。沈伏毒在筋。骨。滿。滿。不。調。毒。在。血。分。夏。暑。腳。膝。冷。其。脈。陽。滿。陰。弱。爲。溼。溫。浮。大。緊。駛。及。沈。細。而。駛。皆。惡。脈。心。下。急。氣。喘。自。汗。脈。促。短。數。嘔。吐。不。止。者。死。

附方

八味丸

見一卷中風

檳蘇散

蒼朮二錢

香附

蘇葉

陳皮

木瓜

檳榔

羌活

牛膝各一錢

甘草三分

葱白二莖

薑

三片

四七湯 見一卷欬嗽

枳實湯 枳實五分 酒浸大黃三錢 羌活錢半 當歸一錢

越婢加朮湯 麻黃 石膏 白朮 甘草 葦 棗

牛膝丸 牛膝二兩 川椒五錢 附子一錢 虎脰骨六錢 酒浸晒研 蜜丸 酒下 忌食動風物

清暑益氣湯 見一卷暑

除溼湯 見一卷溼

葫蘆巴丸 葫蘆巴酒浸一宿焙 故紙炒各四兩 共研以 木瓜切頂去瓢入藥令滿箬合蒸爛搗丸

加味蒼朮散 蒼朮一錢 白朮八分 知母 黃蘗 黃芩 各六分 歸 芍 地各四分 木瓜 檳榔

牛膝 木通 羌 獨 防 草 各二分

勝溼餅子 白丑 黑丑各二兩取頭末五錢 甘菊五錢 蕎麥麪一兩半 水調作餅如錢大飯上蒸熟空

甚腫

心服以
利為度

桑白皮散

赤苓二錢 木香 防己 檳榔各一錢二分

蘇葉 木通 大腹子

青皮各七分
薑三片

羌活導滯湯

大黃酒煨二錢四分 羌活 獨活各一錢二分

枳實五分

當歸拈痛散

見一卷

小續命湯

見一卷中風

敗毒散

見一卷傷風

半夏湯

半夏 人參 炙草各錢半

桂心各三錢 細辛 蜀椒各一錢

乾薑二錢 附子 分三服

杉木節湯

杉木節一升 檳榔七枚

童便三升煮一升半 分二服 則以橘皮代之

金鈴子散

見三卷鬱

逆火拈腸悶胸毒熱風中熱溼下疏

阻滿，

沈香導氣湯

羌牯
八分

枳壳

檳榔

蘇葉 各一錢

川芎子

瓜香附各

各六分
沈香各

五分 炙草

1

蘇子降氣湯

見一卷失音

養正丹

見三卷嘔吐

平胃散

水
撲
陳
草
蘆
棗

木莢湯

木瓜 檳榔各一錢半

吳茱萸錢半

腎氣丸

見一卷虛損

獨活寄生湯

見一卷注

羌活續斷湯

当无

替續
娃子

牛防
漆

九
杜
坤
芷

歸

捉虎丹

五靈脂

白膠香

草烏

黑豆同

木

京子
各地

注走

五靈脂
龍名兩半

乳膠香

草歸

各藥豆同錢

腐木

京墨各地

腫痛筋急

三錢半 糯米糊丸
酒下

五加皮丸 五加皮四兩酒浸 遠志四兩酒浸 晒研酒糊

芋根湯 杜仲三錢 當歸 川斷 胡桃肉 杞子 白芩
根各二錢 桑枝炒四錢 紅花 秦艽 桃仁各

一錢 煎服將藥渣
乘熱喫之


三將軍丸 茱萸 木瓜 大黃 等分糊丸 耑治腳氣攻

腳氣湯 萆薢五錢 茯苓 桑枝各三錢 蒼朮 薏仁
牛膝各二錢 秦艽 澤泄各錢半

檳榔湯 檳榔 木香 茴香 等分加童便 薑汁 溫服

香蘇散 香附三兩 蘇梗二兩 陳皮一兩 甘草五錢
薑三片 葱白連根二莖

木通散 木通 紫蘇 猪苓各一兩 桑白皮薑汁炒 檳
榔 赤苓各二兩 每服五錢 葱 薑 水煎



腳氣

湯氏腳氣宿恙不離溼熱恰逢梅夏陰雨溼熱百痕灰黃食少不
飢藥忌濁膩脾惡溼也再以其年肝腎脈虛寒濕用足腫帶下腰
痛季脇自左注右不能側臥乃陽維帶脈寒濕治從絡脈佐理
脾陽做古飲子法獨藥精投熱地炒沙苑子水炒杞子焙各
牛膝酒炒歸身酒洗砂仁分茯苓生杜仲桑寄生續
斷各二錢糯稻根鬚一劑痛止再劑食進多服並腳氣不數發

卷之三

卷之三

三

鶴膝風論治 膝遊風 膝眼毒 膝離附

膝者筋之府。屈伸不利。兩膝墜腫。內外皆痛。腿細膝粗。如鶴之膝。

是名鶴膝風。多由足三陰經虧損。風邪乘之使然。治在活血榮筋。

兼理風溼。十全大補湯加杜仲、牛膝、羌活、獨活。初起漫腫不紅。屈伸不利。用葱熨法。

或隔蒜灸內。切忌針刺。或用陳芥子研細。葱一伏時。患上起泡泡。

服大防風湯。乾皮脫自愈。若寒熱齊作。加烏藥、薑、桂。若皮色不變。大腮通腫。神

散。若無根虛火。條忽發熱。十全大補湯。血虛發熱面赤。脈大而湯。當歸

湯。陰虛形瘦發熱。六味地黃湯。若扶溼熱。蒼龜丸。或若係風溼。與骨丹。

若侵水溼。蒸膝。食少面黃。六君中氣不足。氣湯。屈伸不利。丹。活絡

成膿潰爛。大防風湯。膿清肌肉不生。或頭暈吐痰。八味地黃丸。山腳軟。

漸成鶴膝。

獨活寄生湯。

但一膝引痛。上下不甚腫。而微紅者。名膝遊風。

防風通聖散。加木

或膝兩旁腫痛。憎寒壯熱。腫處手不可近者。名

瓜牛膝。或換骨丹。

或膝蓋上腫痛。亦發寒熱。名膝癰。治同。

膝眼毒。命飲加牛膝。

或膝蓋上腫痛。亦發寒熱。名膝癰。治同。

醫通曰。婦人鶴膝風。因鬱怒致損肝脾。而為風邪所襲。或先肢體

筋攣。膝漸大。腿漸細。如鶴膝狀。其腫高赤痛者。易治。漫腫不紅痛

者。難治。二三月潰而膿稠者。易治。半載後潰而膿清者。難治。誤用

攻伐。復傷元氣。尤為難治。宜固元氣為主。其食少體倦。六君補熱

內熱寒熱往來。

逍遙散。

發熱惡寒。

十全大補湯。

驚悸少寐。

歸脾湯。

月經過期。

補中益

月經先期。

加味逍遙散。

腎陰虛弱。

六味地黃丸。

凡潰後宜大補脾胃。

若膿出反痛。或寒熱煩渴。皆屬氣血虧損。治以培補為宜。

八珍湯。

小兒鶴膝風。多因先天腎氣衰薄。陰寒凝聚於腰膝。古方以六味

補腎水。以鹿茸補命火。以牛膝引至骨節而北裏。此治本良法也。

喻嘉言曰。鶴膝風。卽風寒溼之痺於膝者也。如膝骨日大。上下肌肉日枯。且未可先治其膝。宜養氣血使肌肉漸榮。再治其膝可也。此與治偏枯之症大同小異。急溉其未枯者。使氣血流行而復榮。倘不知此。但用麻黃等散風之藥。鮮有不全枯者。故治鶴膝而急攻其痺。必非其足痿而不用矣。

附方

十全大補湯 見一卷中風

大防風湯 補溫散
川芎各七分半
蒼朮
羌活
人參
牛膝
炙甘草
附子

溫散退腫補血陰陽溼熱溼熱風溼風

五分 白朮錢半

加減五積散 見一卷溼

神效散 人參二錢 歸身 芍藥 甘草各一錢 薑三片

當歸補血湯 當歸 黃耆

六味丸 見一卷中風

蒼龜丸 二朮 龜板各二兩半 黃藥五錢 粥丸 每五

二妙散 見一卷溼

換骨丹 當歸一兩 虎脰骨酥炙一具 羌活 防

各五兩 白茄根八兩 蒼朮四兩 龜板一兩 用無灰

散膝湯 黃耆五兩 防風三錢 肉桂五錢 茯苓一兩

風溼補脾補氣舒筋溼痺遊風膝眼毒消

蒸膝湯 生薑入兩 石斛 薏苡各二兩 肉桂二錢 水煎二碗先服一碗覆被取汗 再服汗透二劑全愈

六君子湯 見一卷中風

補中益氣湯 見一卷中風

活絡丹 見本卷痺

獨活寄生湯 見一卷溼

防風通聖散 見本卷癰風

勝金丹 白朮製 麝香各五分 蟾酥一錢 地黃 辰砂 乳 沒 血竭各錢半 全蠍 天龍 甲片各三

錢砂糖調 葱白 酒送下 每三

仙方活命飲 甲片 防芷 草 赤芍 歸尾 花粉 貝母 角刺各一錢 陳皮 銀花各三分

乳 沒各一錢 水酒各半煎

除蒸安神培補

逍遙散

見一卷火

歸脾丸

見二卷勞瘵

八珍湯

見一卷中風

破傷風論治

破傷淫

破傷火附

凡金瘡跌撲損破皮肉及瘡瘍潰後。切忌當風用扇。若為風邪所

乘。皆能傳入經絡。名破傷風。其症寒熱間作。牙關微緊。即宜威靈

頭蒜一枚。同爛搗。甚則發瘕。口噤。項強。體直。殺人。急用獨聖散。蘇

熱酒沖服。汗出愈。或用生蠟二兩半。切剝如泥。入花椒一兩。其破傷重。亡血

同酒炒熟。再入酒二盞。熱服。少頃通身汗出。神效。多筋絡失榮。賊風易襲。經所謂風邪乘虛入之也。此為風虛邪。宜

枝湯。合當若因營熱煽風。瘡勢焮腫。河間所謂熱甚風搏。併於經

絡也。此為風火邪。當歸地夫傷風法當疏表。然不宜峻用汗劑者。

仲景謂瘡家不可發汗。汗之則變瘕。故破傷症輕者。但用葱白香

白芷。黃歸。鯁鯉。疰重者亦用本方。加防風。遠志。甚則用萬靈丹。煎

甲。麝香。蠟尾。黃耆肉桂。犀角。鯁鯉。用。葱豉湯下。破傷風

若嘔逆不食。係風引邪毒攻心。內用護心散。外用葱熨法。大便不通。但用蜜煎導。症

勢稍退。即宜保元湯。仍加遠志。肉桂。犀角。鱉鯉甲。解散餘毒。如久不合口。瘡毒內蘊熱

甚。生風周圍起白痂。不甚腫。身發寒熱。牙關微緊急。服玉真散。口

調下。即用此。倘瘡勢紅腫。用杏仁泥。和白麩。如身冷牙噤。腰脊反

張。四肢強直。急服全蠍散。或大蜈蚣散。用小蜈蚣。如服後不解。邪漸

入裏。發搐目直視。二便秘。用左龍丸。其背後搐者。太陽也。為在表。太陽

身後。背後搐。無汗。急汗之。防風湯。九味羌活湯。汗過多止之。防風當歸

如角弓反張。風身而搐者。陽明也。為入裏。陽明經行身。前。身。前。搐。急。下之。先川

黃湯二服。後用兩旁搐者。少陽也。為半表半裏。少陽經行身。側。兩

大芎黃湯下之。視或左右一。手一足搐。宜和之。小柴胡湯。或防風通聖散。加減。此河間法也。其但言三陽不

及三陰者。謂風邪傳入三陰。其症必危。惟天靈蓋般末一錢。鯁鯉
葱白香豉。若少腹滿。白利口燥咽乾。舌捲囊縮。額上珠汗不流。肢
體痛極。不在傷處。終為死候。

凡痛治破傷風。宜曹氏秘方。荆芥黃蠟魚鰓各五錢。艾葉三

疰。宜。病久衰弱。宜主調營。四物湯。加防

急。羌活防風湯。加。破傷。癰腫不透。出。珠砂指甲散。酒調服。外

又或用湯淋洗。溼氣侵入。瘡口流膿。其人昏迷沈重者。名破傷溼。

先用除溼湯。若艾炙火烘。火氣逼入。瘡口腫赤。其人煩躁發熱者。

名破傷火。小芎黃湯。加薄荷

醫鑑曰。諸瘡欲變瘰癧。宜。急風。發汗多成瘰癧。宜。防風常。亡血多成瘰癧。

宜當歸地黃湯。

破傷風脈候

破傷風脈浮而無力。太陽也。長而有力。陽明也。浮而弦者。少陽也。正洪數者。傷火。乳細者。傷溼。虛細而瀉。皆不治。

附方

桂枝湯 見四卷瘧

當歸補血湯 黃耆 當歸

當歸地黃湯 地黃 芍 歸 芎 防 芷 藥本各一錢

葱白香豉湯 見一卷溫

萬靈丹 歸 芎 荆 防 辛 草 麻黃 天麻 川烏
草烏 首烏 茅朮 石斛 雄黃 蜜丸

薄取外治使秘補元風痙身冷風毒去風入裏

護心散

萊豆粉一兩 乳香三錢 辰砂 甘草各一錢
研細 早暮各服三錢開水下

葱熨法

大蔥一握隔湯蒸熟以線紫切平其底乘熱熨背冷
即更換得微汗為度明日再熨

蜜煎導

用蜜熬捏成如棗核納肛內

保元湯

見一卷火

玉真散

防風 南星 等分為末每服一錢 薄荷汁和酒調
服 名定風散 以此蜜調敷瘡效 再加白芷 天

麻

羌活 白附子 等分并末調敷瘡口 名玉真散 凡

打傷

欲死唯是心頭溫者用藥末二錢熱酒童便下二服效

全蠍散

蠍尾七個為末熱酒調服日三次 凡破傷風非此
不除

大蜈蚣散

蜈蚣二条魚鱉炒 左蟠龍即鴿糞炒則盡各五
錢 為末每服二錢 防風湯下

小蜈蚣散

蜈蚣一条 全蠍二个炒研 擦牙出涎 治口
噤身反張不省人事

左龍丸

左蟠龍即鴿糞炒 魚鱉蛤粉炒各五錢
雄黃一錢 天麻二錢 飯糊丸桐子大 每服十

破傷風

無汗通治

散風汗多固衛陽明風秘

五九溫酒下日三服 如症重每藥末一錢飯糊中 加入

巴豆霜五厘 每服中加一九漸加至十九以利爲度痛愈

即止 一方有

大蜈蚣二条

防風湯 防 芎 羌 獨各一錢二分半

水煎調蜈蚣散

九味羌活湯 羌活錢半 防風 茅朮各一錢 細辛五分

二莖 薑三片 芎 芷 芩 地各八分 炙草六分 葱白

棗一枚

小續命湯

見一卷中風

防風當歸散

防 歸 芎 地各一錢半

白朮防風湯

朮 者各二錢 防風四錢

小芎黃湯

川芎 黃芩各一錢半 炙草一錢 葱白四莖

大芎黃湯

香豉四合 水煎 即小芎黃去甘草 加酒炒大黃三錢 羌活錢

少陽風熱通治通治通治營虛風疼透膿傷溼傷溼變瘰

小柴胡湯 見一卷溫

防風通聖散 見本卷癰風

曹氏秘方 荊芥 黃蠟 魚鱗各五錢 艾葉三片 無灰

獨瘰湯 羌 獨 防 杏 地榆

四物湯 地 芍 歸 芎

羌活防風湯 羌 防 芎 歸 芍 草 藁本各一錢

硃砂指甲散 硃砂 地榆 細辛各五分 南星薑製 獨活各二錢 人手指甲

除溼湯 見一卷溼

白朮膏 一味生白朮熬

急風散 麝香一字 辰砂一兩 生黑丑二錢半 車厘二

類證治裁卷之五終